



半夏（本經）

天南星科(Araceae)

【學名】半夏（*Pinellia ternata* (THUNB.) BREITENBACH）的乾燥塊莖。

【形態】多年生草本，高15~30cm。幼苗常為單葉，卵狀心形，2~3年後生3小葉的複葉；葉柄長10~15cm，基部有珠芽。花單性同株，花序柄長於葉柄，佛焰苞綠色，下部細筒狀；雌花生於花序基部，雄花生於上端，花序頂端附屬器青紫色，伸於佛焰苞外呈鼠尾狀。漿果卵狀橢圓形，綠色。

【成分】本品塊莖含刺激性苷，甙元為尿黑酸(homogentistic acid)，又含3,4-二羥基苯甲醛尿黑酸及其甙刺激舌根，有強烈澀味，此外有葫蘆巴鹼(trigonelline)、1-麻黃鹼以及凝集素、胰蛋白酶抑制劑、半夏蛋白(pinellin)（半夏蛋白可引起流產）。亦含麥胚固醇(β -Sitosterol)，膽鹼(Choline)、氨基丁酸(β -Aminobutyric acid)、麥胚固醇(β -Sitosterol)、麥胚固醇葡萄糖苷(β -Sitosterol-1-D-glucoside)、膽鹼(Choline)、氨基丁酸(β -Aminobutyric acid)等，屬有毒植物要慎用，一般使用薑半夏。

【性味】性溫，味辛；有毒。

【歸經】入肺、胃經。

【功能、主治】燥濕化痰，降逆止嘔，消痞散結。用於痰多咳喘、痰飲眩暈、痰飲眩暈、痰厥頭痛、嘔吐反胃、胸脘痞悶、梅核氣症；生用外治癰腫痰核。用量3~9g，一般炮製後用。